ÁLCOOL & DROGAS NA SALA DE EMERGÊNCIA

MARCELO RIBEIRO, MSc
UNIAD-UNIFESP



ÁLCOOL

BIRITA. MÉ. BREJA.

PROBLEMAS AGUDOS

(DEPENDEM DA DOSE INGERIDA E DA PESSOA)

SONOLÊNCIA

COMA

DESCONTROLE

LAPSOS DE MEMÓRIA

INCOORDENAÇÃO MOTORA

EPISÓDIOS DEPRESSIVOS E/OU ANSIOSOS AGUDOS

IMPULSIVIDADE

PAVIO CURTO

IRRITABILIDADE

QUEIMAÇÃO NO ESTOMAGO

DOR DE CABEÇA

RESSACA

SEDE

NÁUSEA

MAL-ESTAR

MOLEZA

VOMITO

SENSAÇÃO DE MAL-ESTAR

NÁUSEA

AO DIRIGIR

QUEDAS

RISCO DE ACIDENTES

NO MANUSEIO DE OBJETOS

PROBLEMAS CRÔNICOS

(MAIS PROVÁVEIS QUANTO MAIOR O TEMPO E A FREQÜÊNCIA DE USO)

DEPENDÊNCIA

ANSIEDADE

DEMÊNCIA ALCOÓOLICA

PSICOSE (ALUCINOSE)

DEPRESSÃO

HIPERTENSÃO

PROBLEMAS DO CORAÇÃO

GASTRITE

HEPATITE CIRROSE

ESTEATOSE (FÍGADO GORDUROSO)

MÁ ABSORÇÃO INTESTINAL

PANCREATITE

POLINEURITE

FORMIGAMENTO E CÃIMBRAS NOS MEMBROS INFERIORES

BOCA

ESTÔMAGO

CÂNCER

FÍGADO

PÂNCREAS

PRÓSTATA

SOLVENTES OU INALANTES

LANÇA-PERFUME, LOLÓ.

PROBLEMAS AGUDOS

(DEPENDEM DA DOSE INGERIDA E DA PESSOA)

CONFUSÃO

SONOLÊNCIA

PERDA DO AUTOCONTROLE

COMA

TONTURAS

CONVULSÕES

DOR DE CABEÇA

INCOORDENAÇÃO MOTORA

VISÃO EMBAÇADA

NÁUSEAS

PALIDEZ

PARADA CARDÍACA

USO DE SOLVENTES SEGUIDO POR EXERCÍCIOS FÍSICOS

QUEDAS AO DIRIGIR

RISCO DE ACIDENTES

NO MANUSEIO DE OBJETOS

PROBLEMAS CRÔNICOS

(MAIS PROVÁVEIS QUANTO MAIOR O TEMPO E A FREQÜÊNCIA DE USO)
OS PRINCIPAIS PROBLEMAS FORAM OBSERVADOS EM TRABALHADORES QUE FICARAM EXPOSTOS AOS SOLVENTES POR LONGOS ANOS.



DEPRESSÃO

DÉFICIT DE MEMÓRIA

APATIA

LESÕES CEREBRAIS IRREVERSÍVEIS

DEMÊNCIA

DIFICULDADE DE CONCENTRAÇÃO

RINS

FÍGADO LESÕES IRREVERSÍVEIS

MEDULA ÓSSEIA

MARCHA DO PATO

DEGENERAÇÃO DOS NERVOS PERIFÉRICOS

PARALISIA DOS MEMBROS INFERIORES

CALMANTES

BENZODIAZEPÍNICOS

DIAZEPAM, CLONAZEPAM, BROMAZEPAM, MIDAZOLAM, FLUNITRAZEPAM, ALPRAZOLAM, LORAZEPAM & OUTROS.

PROBLEMAS AGUDOS

(DEPENDEM DA DOSE INGERIDA E DA PESSOA)

SONOLÊNCIA
DISTRAIBILIDADE
DESATENÇÃO
LENTIFICAÇÃO DOS PENSAMENTO

INCOORDENAÇÃO
LENTIFICAÇÃO
FUNÇÃO MOTORA
MOLEZA
FRAQUEZA

TONTURAS
MOLEZA
DESMAIO
SUOR
QUEDA DA PRESSÃO ARTERIAL
LÁBIOS E EXTREMIDADES AZULADAS
PALIDEZ
MAL-ESTAR

OS PROBLEMAS AGUDOS DOS CALMANTES SE INTENSIFICAM AINDA MAIS APÓS O USO DE ÁLCOOL.

QUEDAS AO DIRIGIR
RISCO DE ACIDENTES
NO MANUSEIO DE OBJETOS

PROBLEMAS CRÔNICOS

(MAIS PROVÁVEIS QUANTO MAIOR O TEMPO E A FREQÜÊNCIA DE USO)

DEPENDÊNCIA
DEPRESSÃO
ANSIEDADE

NÁUSEAS
DOR DE CABEÇA
INSÔNIA
DORES PELO CORPO
SÍNDROME DE ABSTINÊNCIA
IRRITABILIDADE
DESCONCENTRAÇÃO
CONVULSÕES

PIORA DO DESEMPENHO INTELECTUAL

DÉFICITS PERMANENTES DE MEMÓRIA



DERIVADOS DO ÓPIO

DERIVADOS NATURAIS: MORFINA E CODEÍNA
DERIVADOS SEMI-SINTÉTICOS: HEROÍNA
DERIVADOS SINTÉTICOS: MEPRIDINA (DOLANTINA), FENTANIL E OUTROS.

PROBLEMAS AGUDOS

(DEPENDEM DA DOSE INGERIDA E DA PESSOA)

- PELE FRIA
- QUEDA DA PRESSÃO ARTERIAL
- AUMENTO DOS BATIMENTOS DO CORAÇÃO
- LÁBIOS & EXTREMIDADES AZULADOS
- SEDAÇÃO EXCESSIVA
- COMA
- DEPRESSÃO RESPIRATÓRIA (RESPIRAÇÃO FRACA)
- OVERDOSE
- DIMINUIÇÃO DOS BATIMENTOS DO CORAÇÃO
- QUEDAS AO DIRIGIR
- RISCO DE ACIDENTES NO MANUSEIO DE OBJETOS

PROBLEMAS CRÔNICOS

(MAIS PROVÁVEIS QUANTO MAIOR O TEMPO E A FREQÜÊNCIA DE USO)

- DEPENDÊNCIA
- DEPRESSÃO
- MAL ESTADO DOS DENTES E DA BOCA
  DEVIDO À DIMINUIÇÃO DA SECREÇÃO DE SALIVA E À INIBIÇÃO DA DOR DE DENTE CAUSADA PELOS OPIÁCEOS
- CONSTIPAÇÃO CRÔNICA (INTESTINO RESSECADO)
- SÍNDROME DE ABSTINÊNCIA
  - LACRIMEJAMENTO
  - SUOR INTENSO
  - ANSIEDADE
  - EREÇÃO DOS PÊLOS
  - RINITE
  - CÃIMBRAS
  - AUMENTO DOS BATIMENTOS DO CORAÇÃO
  - DIARRÉIA

VEJA TAMBÉM A SESSÃO "DROGAS INJETÁVEIS"

TABAÇO

CARETA

PROBLEMAS AGUDOS

(DEPENDEM DA DOSE INGERIDA E DA PESSOA)

- NÁUSEA
- DOR DE CABEÇA
- DIARRÉIA
- INICIANTES
- TONTURAS
- TOSSE

PROBLEMAS CRÔNICOS

(MAIS PROVÁVEIS QUANTO MAIOR O TEMPO E A FREQÜÊNCIA DE USO)

- DEPENDÊNCIA
- PNEUMONIAS
- FARINGITES
- INFECÇÕES RECORRENTES
- LARINGITES
- SINUSITES
- PIGARRO
- DERRAME CEREBRAL
- ASMA
- BRONQUITE
- INFISEMA PULMONAR
- MAU HÁLITO
- MAU CHEIRO
- ÚLCERA DE ESTÔMAGO
- INFARTO DO MIOCÁRDIO
- TOSSE
- DENTES AMARELADO
- BOCA
- RETRAÇÃO DA GENGIVA
- QUEIMAÇÃO NO ESTÔMAGO
- QUEIMADURAS
- INCÊNDIOS
- RISCO DE ACIDENTES
- AO DIRIGIR
- SE DISTRAIR COM O CIGARRO
- LARINGE
- FARINGE
- PULMÃO
- ESÔFAGO
- CÂNCER
- BOCA
- INTESTINO
- ESTÔMAGO
- BEXIGA

COCAÍNA & CRACK

PÓ. FARINHA. BRILHO. COCA.
CAROLINA. BRISA. BRIGHT.
TIRO. PAPEL. BRANQUINHA

PEDRA. LASCA.

PROBLEMAS AGUDOS

(DEPENDEM DA DOSE INGERIDA E DA PESSOA)

SINTOMAS PARANÓIDES ('NÓIA')

MAL-ESTAR (ANSIEDADE)

SINTOMAS DE PÂNICO

DILATAÇÃO DAS PUPILAS (PIORA DA VISÃO)

DERRAME

CONVULSÕES

INFARTO DO CORAÇÃO

AUMENTO DA PRESSÃO ARTERIAL

PROBLEMAS PULMONARES (CRACK)

INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA

TREMORES

AUMENTO DA TEMPERATURA

QUEDAS

AO DIRIGIR

RISCO DE ACIDENTES

NO MANUSEIO DE OBJETOS

PROBLEMAS CRÔNICOS

(MAIS PROVÁVEIS QUANTO MAIOR O TEMPO E A FREQÜÊNCIA DE USO)

DEPRESSÃO

PSICOSE

DEPENDÊNCIA

NECROSE DE SEPTO NASAL

DOENÇAS PULMONARES (CRACK)

PIORA DO DESEMPENHO SOCIAL E PROFISSIONAL.

ISOLAMENTO

DOENÇAS DO CORAÇÃO



VEJA TAMBÉM A SESSÃO "DROGAS INJETÁVEIS"

ANFETAMINAS

BOLINHAS, REPITE, SPEED, PÍLULAS PARA EMAGRECER

PROBLEMAS AGUDOS

(DEPENDEM DA DOSE INGERIDA E DA PESSOA)

- ANSIEDADE
- DESCONCENTRAÇÃO
- INQUIETAÇÃO
- PSICOSE AGUDA
- AUMENTO DA PRESSÃO ARTERIAL
- AUMENTO DA SENSIBILIDADE À LUZ
- EMBAÇAMENTO VISUAL
- CONVULSÕES
- AUMENTO DA TEMEPRATURA CORPORAL

LEIA TAMBÉM SOBRE A HIPERTERMIA NA SESSÃO "ECSTASY"

PROBLEMAS CRÔNICOS

(MAIS PROVÁVEIS QUANTO MAIOR O TEMPO E A FREQÜÊNCIA DE USO)

- DEPRESSÃO
- SÍNDROME DO PÂNICO
- PSICOSE
- DEPENDÊNCIA
- IRRITABILIDADE
- IMPULSIVIDADE
- DÉFICITS DE MEMÓRIA
- SENSAÇÃO DE CANSAÇO CONSTANTE
- INSÔNIA

LEIA TAMBÉM SOBRE AS "DROGAS INJETÁVEIS"



RISCO DE ACIDENTES

- QUEDAS
- AO DIRIGIR
- NO MANUSEIO DE OBJETOS

ECSTASY

METILENODIOXI-N-METILANFETAMINA (MDMA)

E, BALA.

PROBLEMAS AGUDOS

(DEPENDEM DA DOSE INGERIDA E DA PESSOA)

PÂNICO PARANÓIA
DEPRESSÃO CONFUSÃO

VISÃO EMBAÇADA

INCOORDENÇÃO MOTORA

NÁUSEA ACIDENTES

HIPERTERMIA

AUMENTO EXCESSIVO DA TEMPERATURA CORPORAL (ACIMA DE 40°C)

O ECSTASY ACELERA O FUNCIONAMENTO DO ORGANISMO, DEIXANDO-O MAIS QUENTE.

O USO EM AMBIENTES FECHADOS, LOTADOS E AQUECIDOS, ESQUENTAM AINDA MAIS O CORPO.

NESSA SITUAÇÃO O ORGANISMO PODE ATINGIR TEMPERATURAS INCOMPATÍVEIS COM A VIDA, QUE PROVOCAM CONVULSÕES, PARADAS CARDÍACAS E RESPIRATÓRIAS.

PROBLEMAS CRÔNICOS

(MAIS PROVÁVEIS QUANTO MAIOR O TEMPO E A FREQÜÊNCIA DE USO)

DEPRESSÃO

DÉFICITS PERMANENTES DE MEMÓRIA

O CONSUMO DE ECSTASY É UM FENÔMENO RECENTE.

POR ISSO, SUAS COMPLICAÇÕES CRÔNICAS NÃO SÃO TOTALMENTE CONHECIDAS.

O USO REPETIDO PARECE PRODUZIR DÉFICITS PERSISTENTES NO FUNCIONAMENTO DA SEROTONINA CEREBRAL.

ISSO PODE LEVAR SURGIMENTO DE DEPRESSÃO E DÉFICITS DE MEMÓRIA.



MACONHA & HAXIXE

ERVA, BASEADO, BECK,
FUMO, MATO, PACAU,
BAGULHO, JERERÉ, DIAMBA.

CHOCOLATE, BOLOTA, HASH

PROBLEMAS AGUDOS

(DEPENDEM DA DOSE INGERIDA E DA PESSOA)

SINTOMAS DE PÂNICO (BAD TRIPS)

DESATENÇÃO

PSICOSE AGUDA

INCOORDENAÇÃO MOTORA

MOLEZA (LESEIRA)

TREMORES

SONOLÊNCIA

SUOR

QUEDAS AO DIRIGIR

RISCO DE ACIDENTES NO MANUSEIO DE OBJETOS

PROBLEMAS CRÔNICOS

(MAIS PROVÁVEIS QUANTO MAIOR O TEMPO E A FREQÜÊNCIA DE USO)

DEPRESSÃO

PIORA DA CONCENTRAÇÃO

PSICOSE

PIORA DO DESEMPENHO INTELECTUAL

DEPENDÊNCIA

ASMA

CÂNCER DE PULMÃO

BRONQUITE

BAIXA NA PRODUÇÃO DE ESPERMATOZÓIDES (NORMALIZA APÓS A ABSTINÊNCIA)

LSD & CHÁ DE COGUMELO

ÁCIDO. DOCE. AC.
ANTÔNIO CARLOS.
BICICLETINHA.

CHÁ DE COGU.

PROBLEMAS AGUDOS

(DEPENDEM DA DOSE INGERIDA E DA PESSOA)

CONFUSÃO
FALSOS JUÍZOS
PARANÓIA
BAD TRIP
PÂNICO
VISÕES TERRIFICANTES
DEPRESSÃO

DISTORÇÕES VISUAIS



AUMENTO DOS BATIMENTOS DO CORAÇÃO

PIORA DA ATENÇÃO (DISTRAÇÃO)

DESORGANIZAÇÃO DO PENSAMENTO

NÁUSEAS
ESPECIALMENTE O CHÁ DE COGUMELO

QUEDAS
AO DIRIGIR
RISCO DE ACIDENTES
NO MANUSEIO DE OBJETOS

PROBLEMAS CRÔNICOS

(MAIS PROVÁVEIS QUANTO MAIOR O TEMPO E A FREQÜÊNCIA DE USO)

AS SUBSTÂNCIAS ALUCINÓGENAS, DE MODO GERAL NÃO PROVOCAM DEPENDÊNCIA OU SINTOMAS DE ABSTINÊNCIA



A GRANDE PREOCUPAÇÃO COM O USO REPETIDO DESSAS SUBSTÂNCIAS É O SURGIMENTO DE DOENÇAS PSIQUIÁTRICAS, COMO A SÍNDROME DO PÂNICO, A DEPRESSÃO, A ESQUIZOFRENIA, E OS DELÍRIOS DE PERSEGUIÇÃO.

FELIZMENTE, TAIS COMPLICAÇÕES SÃO RARAS E ATINGEM MAIS AQUELES COM PREDISPOSIÇÃO PARA ESTAS DOENÇAS (APESAR DE SER QUASE IMPOSSÍVEL DIZER COM CERTEZA QUEM É DE FATO PREDISPOSTO).

COMO A ESQUIZOFRENIA E OS QUADROS DELIRANTES NÃO TÊM CURA, O APARECIMENTO DESSAS COMPLICAÇÕES ALTERA PROFUNDAMENTE A VIDA DOS ACOMETIDOS.

ANTICOLINÉRGICOS

NATURAIS: CHÁ DE LÍRIO, DATURA (SAIA BRANCA), MANDRÁGORA

SINTÉTICOS: TRIEXIFENIDIL (ARTANE), BIPERIDENO (AKINETON),
BENZIDAMINA (BENFLOGIN, BENZITRAT), COLÍRIOS PARA DILATAR A PUPILA

PROBLEMAS AGUDOS

(DEPENDEM DA DOSE INGERIDA E DA PESSOA)

DELÍRIOS DE PERSEGUIÇÃO

MEDO

PÂNICO

CONVULSÕES

AUMENTO DA PRESSÃO ARTERIAL

EMBAÇAMENTO DA VISÃO

DIFICULDADE PARA URINAR

PRISÃO DE VENTRE

HIPERTERMIA

LEIA A O QUE É NA SESSÃO "ECSTASY"

QUEDAS

AO DIRIGIR

RISCO DE ACIDENTES

NO MANUSEIO DE OBJETOS



PROBLEMAS CRÔNICOS

(MAIS PROVÁVEIS QUANTO MAIOR O TEMPO E A FREQÜÊNCIA DE USO)

PSICOSE

NÃO HÁ ESTUDOS DEFINITIVOS SOBRE O USO CRÔNICO DE ANTICOLINÉRGICOS.

DEVE-SE TER EM MENTE QUE OS ANTICOLINÉRGICOS BLOQUEIAM UM SISTEMA DE NEUTRANSMISSÃO QUE REGULA OS MOVIMENTOS AUTOMÁTICOS DO CORPO (BATIMENTOS DO CORAÇÃO, INTESTINOS, VISÃO,...).

ALTERÁ-LO CRONICAMENTE COM CERTEZA PODE TRAZER DANOS AO USUÁRIO.

ESTERÓIDES ANABOLIZANTES

OS PROBLEMAS CAUSADOS PELOS ANABOLIZANTES SÃO PRINCIPALMENTE CRÔNICOS.

O RISCO DE COMPLICAÇÕES AUMENTA QUANTO MAIOR A DOSE E O TEMPO DE USO.



TREMORES

RETENÇÃO DE LÍQUIDOS

DORES NAS JUNTAS

ACNE

ÍMPETOS AGRESSIVOS

RAIVA

VARIAÇÃO DO HUMOR

DEPRESSÃO

DELÍRIOS

CIÚME PATOLÓGICO

ESQUECIMENTO

ILUSÕES

DESENVOLVIMENTO DE MAMAS

DIMINUIÇÃO DOS TESTÍCULOS

IMPOTÊNCIA

HOMENS

CALVÍCIE

INFERTILIDADE

REDUÇÃO DO NÚMERO DE ESPERMATOZÓIDES

AUMENTO DA PRÓSTATA

DIFICULDADE PARA URINAR

TUMOR DE FÍGADO

ICTERÍCIA

PELE AMARELADA

MATURAÇÃO ESQUELÉTICA PREMATURA

ADOLESCÊNCIA ACELERADA

JOVENS

CRESCIMENTO RAQUÍTICO

CRESCIMENTO DE PÊLOS FACIAIS

ALTERAÇÃO OU AUSÊNCIA DE CICLO MENSTRUAL

MULHERES

AUMENTO DO CLITÓRIS

VOZ GROSSA

DIMINUIÇÃO DOS SEIOS

DROGAS INJETÁVEIS

COCAÍNA, HEROÍNA, ANFETAMINAS & ANABOLIZANTES

PICO, BAQUE, POR NOS CANOS

COMPLICAÇÕES

AS COMPLICAÇÕES RELACIONADAS AO USO DE DROGAS INJETÁVEIS PODEM OCORRER DE MODO AGUDO OU CRÔNICO. NO ENTANTO, QUANTO MAIS VEZES E POR MAIS TEMPO ESSA VIA DE ADMINISTRAÇÃO FOR UTILIZADA, MAIORES SERÃO OS RISCOS.



INCHAÇO
DOR
TROMBOSE VENOSA
ENTUPIMENTO DA VEIA
PALIDEZ ABAIXO DO ENTUPIMENTO

DERRAME CEREBRAL

VÁLVULAS DO CORAÇÃO
HEPATITE B & C
INFECÇÕES PELE POR AGULHAS CONTAMINADAS
VEIAS DO CÉREBRO
INFECÇÃO GENERALIZADA (SEPTICEMIA)

DOR INTENSA
AUSÊNCIA DE PULSAÇÃO
PALIDEZ
TROMBOSE ARTERIAL
ENTUPIMENTO DA ARTÉRIA
EXTREMIDADES ROXAS
FORMIGAMENTO

HEPATITE B & C
SÍFILIS
AIDS
INFECÇÕES POR COMPARTILHAMENTO DE AGULHAS
OUTRAS INFECÇÕES

VERMELHIDÃO NO LOCAL
DOR
FLEBITE
INFLAMAÇÃO DA VEIA
ENDURESCIMENTO DA VEIA.
INCHAÇO LOCALIZADO

PARADA CARDÍACA

QUEDAS
AO DIRIGIR
RISCO DE ACIDENTES
NO MANUSEIO DE OBJETOS

HEPATITE TÓXICA

EMBOLIA PULMONAR
ESCARROS COM SANGUE
FALTA DE AR INTENSA
ENTUPIMENTO PARCIAL DA CIRCULAÇÃO PULMONAR POR COÁGULOS.