

Síndrome de dependência do álcool: critérios diagnósticos

Alcohol dependence syndrome: diagnostic criteria

Analice Giglioti^a, Marco Antonio Bessa^b

^a Setor de Dependência Química- Santa Casa do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, RJ Brasil.

^b Disciplina de Psiquiatria da Faculdade Evangélica de Medicina do Paraná, Clínica Heidelberg de Curitiba. Curitiba, PR, Brasil.

Resumo A síndrome de dependência do álcool (SDA) é um grave problema de saúde pública. Embora seja bem estudada e seu quadro clínico seja bem estabelecido, muitas vezes a SDA passa despercebida mesmo em avaliações psiquiátricas. Este trabalho apresenta um breve relato das relações que a sociedade e o homem mantêm com as bebidas alcoólicas, enfatizando o desenvolvimento do conceito de alcoolismo na medicina, até atingir a definição de SDA, tal como é descrita hoje pela CID-10 e DSM-IV. Procura mostrar como existem diversas formas de uso do álcool, que implicam em distintos níveis de risco e de gravidade no seu consumo e que evoluem como um *continuum*. Tais diferenças são frisadas no cotejamento entre os conceitos de uso nocivo e de dependência do álcool, que se revestem de muita importância na clínica, tanto na prevenção quanto no tratamento desse transtorno, que devem ser do conhecimento de todo psiquiatra.

Descritores: Álcool. Síndrome de dependência do álcool. Uso nocivo do álcool. Critérios diagnósticos. Alcoolismo.

Abstract The Alcohol dependence syndrome (ADS) is a serious problem of public health. In spite of being deeply studied and having well-established diagnostic criteria, many times clinicians and even psychiatrists do not notice this disorder. The aim of this paper is to make a brief exposition on how men and society have developed their relationship with alcohol, emphasizing the development of the concept of alcoholism in medicine until the definition of ADS in ICD-10 and DSM-IV. The article explains the different ways of alcohol consume and how it influences different levels of risk and severity of its consequences, that evolves as a *continuum*. At last, it makes a comparison between ADS and alcohol harmful use, very important in the prevention and treatment of such disorders.

Keywords Alcohol. Alcohol dependence syndrome. Harmful use of alcohol. Diagnostic criteria. Alcoholism.

I. Introdução

O álcool é uma substância que acompanha a humanidade desde seus primórdios e sempre ocupou um local privilegiado em todas as culturas, como elemento fundamental nos rituais religiosos, fonte de água não contaminada ou ainda presença constante nos momentos de comemoração e de confraternização, quando se brinda a todos e a tudo. O álcool sempre esteve envolto em simbolismo, tendo-se o vinho na Eucaristia, o símbolo da energia vital, produto da união de elementos contrários, a água e o fogo, a *aqua vitae* na alquimia Ou na bela metáfora de Bachelard¹ : “ A aguardente é a água de fogo, a água que queima (..) e se inflama.. É a comunhão da vida com o fogo. O álcool é também um alimento que produz calor no centro do peito”.

Através da história, o álcool tem tido múltiplas funções, atuando como: veículo de remédios, perfumes e poções mágicas, e principalmente sendo o componente essencial de bebidas que acompanham os ritos de alimentação dos povos. Faz parte do hábito diário de famílias em todo o mundo, servindo de alimento e de laço de comunhão entre as pessoas. No entanto, à medida que as sociedades foram passando por transformações econômicas e sociais, principalmente com a revolução industrial, que provocou as grandes concentrações urbanas, e multiplicou enormemente a produção e a disponibilidade das bebidas e reduziu de modo drástico os seus preços, houve uma mudança profunda na maneira da sociedade e os homens relacionaram-se com o álcool. É como se houvesse sido revelada a outra face da moeda. Ou seja, a mesma substância que irmana, comunga e alegre, também estimula a agressividade, a discórdia e a dor, rompendo laços de família, de amizade e de trabalho.

As bebidas alcoólicas são portadoras desta função ambígua, se de um lado são produtos transbordantes de significados, como o vinho no catolicismo ou na sofisticação da culinária e do comércio internacional, onde um produto alcoólico pode custar até milhares de dólares, de outro, o uso exagerado dessas bebidas pode originar uma grave transtorno de saúde pública mundial.

II- A Evolução do conceito de Alcoolismo

O conceito de alcoolismo só surgiu no século XVIII, logo após a crescente produção e comercialização do álcool destilado, conseqüente à revolução industrial. Deste período destacam-se dois autores: Benjamin Rush e Thomas Trotter. O primeiro, um psiquiatra americano, foi responsável pela célebre frase “Beber inicia num ato de liberdade, caminha para o hábito e, finalmente, afunda na necessidade”. O segundo foi quem pela primeira vez referiu-se ao alcoolismo como “doença”². Outro autor de relevância foi o sueco Magnus Huss (1849) que introduziu o conceito de “alcoolismo crônico”, estado de intoxicação pelo álcool que se apresentava com sintomas físicos, psiquiátricos ou mistos.

Na segunda metade do século XX o sistema de classificação, pela necessidade de critérios de maior confiabilidade e validade, passa por mudanças e começa a considerar os problemas com o álcool e outras drogas que não envolviam adicção ou dependência. Evidencia-se aqui o nome de Jellinek³ com seu clássico trabalho *“The Disease Concept of Alcoholism”*, que exerceu grande influência na evolução do conceito desta dependência, considerando o alcoolismo doença apenas quando o usuário apresenta tolerância, abstinência e perda do controle. Entende-se já aí tolerância como a necessidade de doses cada vez maiores de álcool para que exerça o mesmo efeito, ou diminuição do efeito do álcool com as doses anteriormente tomadas; e por síndrome de abstinência um quadro de desconforto físico e/ou psíquico quando da diminuição ou suspensão do consumo etílico.

Nessa classificação Jellinek diferenciava os transtornos por de uso do álcool em aqueles que envolviam um claro processo de dependência (tipos gama e delta) e em aqueles sem dependência (tipos alfa, beta, épsilon). No entanto, apenas no DSM-III⁴ e na CID-8⁵ é que os transtornos por uso de substâncias sem dependência foram introduzidos.

A CID-8, apresentava a adicção ao álcool como um estado de dependência física e emocional com períodos de consumo pesado e incontrolável, nos quais a pessoa experimentava uma compulsão para beber e sintomas de abstinência quando cessava o consumo. Outros padrões patológico de

beber tais como, beber episódico e excessivo distinguiam-se da adicção pela ausência de compulsão e abstinência.

Em 1976, Griffith Edwards e Milton Gross propuseram uma nova síndrome – a Síndrome de Dependência do Álcool (SDA).

III. Conceito da SDA

A SDA não é uma enfermidade estática que se define em termos absolutos, mas um transtorno que se constitui ao longo da vida. É um fenômeno que depende da interação de fatores biológicos e culturais – por exemplo, religião e valor simbólico do álcool em cada comunidade -, que determinam como o indivíduo vai se relacionando com a substância, em um processo de aprendizado individual e social do modo de se consumir bebidas. Nesse processo de aprendizado da maneira de usar o álcool um dos fenômenos mais significativos é o surgimento dos sintomas de abstinência. Quando a pessoa passa ingerir a bebida para aliviar esses sintomas é estabelecida uma forte associação que sustenta tanto o desenvolvimento quanto à manutenção da dependência.

IV. Identificação dos componentes da SDA

Segundo Edwards⁶, a dependência seria “um relacionamento alterado entre a pessoa e sua forma de beber” onde, às razões pelas quais o indivíduo começou a beber, adicionam-se àquelas relacionadas à dependência. Assim sendo, a dependência torna-se um comportamento que se retro-alimenta, e que abrange muito mais que tolerância e abstinência.

Os elementos da Síndrome de Dependência Alcoólica são:

Estreitamento do repertório

No início o usuário bebe com flexibilidade de horários, de quantidade e até de tipo de bebida. Com o tempo passa a beber com mais frequência, até consumir todos os dias, em quantidades crescentes, ampliando a frequência e deixando de importar-se com a inadequação das situações. Nos estágios avançados o indivíduo consome de modo compulsivo, incontrolável para aliviar os sintomas da abstinência, sem importar-se com os danos orgânicos, sociais ou psicológicos. Sua relação com a bebida torna-se rígida e inflexível, no padrão de tudo ou nada.

Saliência do comportamento de busca do álcool

Com o estreitamento do repertório do beber há uma tentativa do indivíduo de priorizar o ato de beber, mesmo em situações inaceitáveis (por exemplo, dirigindo veículos, no trabalho). Em outras palavras o beber passa a ser o fulcro da vida do usuário, acima de qualquer outro valor, saúde, família e trabalho.

Aumento da tolerância ao álcool

Com a evolução da síndrome, há necessidade de doses crescentes de álcool para obter o mesmo efeito conseguido com doses menores, ou capacidade de realizar atividades apesar de altas concentrações sanguíneas de álcool.

Sintomas repetidos de abstinência

Quando há diminuição ou interrupção do consumo de álcool, surgem sinais e sintomas de intensidade variável. No início eles são leves, intermitentes e são pouco incapacitantes, mas nas fases mais severas da dependência, podem manifestar-se os sintomas mais significativos como tremor intenso e alucinações.

Os estudos descritivos identificaram três grupos de sintomas:

- *físicos*: tremores (desde finos de extremidades até generalizados), náuseas, vômitos, sudorese, cefaléia, câibras, tontura.
- *afetivos*: irritabilidade, ansiedade, fraqueza, inquietação, depressão.
- *sensorial*: pesadelos, ilusões, alucinações (visuais, auditivas ou tácteis).

Alívio ou evitação dos sintomas de abstinência pelo aumento da ingestão da bebida

Este é um sintoma importante da SDA, sendo difícil de ser identificado nas fases iniciais. Torna-se mais evidente na progressão do quadro, com o paciente admitindo que bebe pela manhã para sentir-se melhor, uma vez que permaneceu por toda noite sem ingerir derivados etílicos.

Percepção subjetiva da necessidade de beber

Há uma pressão psicológica para beber e aliviar os sintomas da abstinência.

Reinstalação após a abstinência

Mesmo depois de períodos longos de abstinência, se o paciente tiver uma recaída, rapidamente restabelecerá o padrão antigo de dependência.

Essa sistematização da SDA proposta por Edwards teve sua validade clínica comprovada por inúmeros estudos e modificou a compreensão dos problemas relacionados ao álcool pela medicina, influenciando as classificações posteriores.

V - Diferença entre dependência e uso nocivo

Como já foi apresentado, existem as mais variadas maneiras de consumo do álcool, em uma complexa interação entre fatores biológicos, culturais e ambientais, onde o resultado, na maioria das vezes, não é o da dependência, mesmo para aqueles que em algum período da vida fizeram uso problemático desta substância.

A SDA proposta por Edwards, cria uma distinção clínica entre o que é dependência e quais seriam os problemas relacionados, estabelecendo graus variáveis de risco e de problemas ocasionados pelo uso do álcool, dispostos em duas dimensões: uma associada com a psicopatologia do beber, a *dependência* do álcool e outra onde se distribuem os diversos *problemas* oriundos do uso ou da

dependência. A figura 1 mostra estas dimensões, sendo o eixo horizontal a representação da *dependência* e o eixo vertical a representação da dimensão *problemas*.

No quadrante I localizam-se aqueles indivíduos que na medida em que vão ficando mais dependentes, passam a ter mais problemas relacionados ao álcool. No quadrante II encontram-se aqueles que apesar de terem problemas com álcool (no trabalho, na família, acidentes de trânsito, etc) não apresentam dependência alcoólica; ou seja, fazem uso nocivo. Já no quadrante III estão os indivíduos que não têm problemas nem dependência alcoólica. São os bebedores com consumo de baixo risco. O quadrante IV é inexistente uma vez que não existe dependência alcoólica sem problemas relacionados ao consumo do mesmo. Esta divisão em quadrantes é usada até os dias de hoje para descrever o padrão de consumo de drogas. E indica as diferentes formas e níveis de relacionamento dos indivíduos com a bebida, estabelecendo padrões peculiares de consumo ao longo do tempo, ressaltando-se que a pessoa pode ter problemas com qualquer padrão de consumo.

Com sua publicação, o conceito de SDA exerceu forte impacto na confecção do DSM-III⁴, que caracterizava a categoria de abuso de álcool e outras drogas por padrões de uso patológico e prejuízos nas funções sociais e ocupacionais relacionados ao uso, e para a categoria de dependência, além disso, exigia a presença ou de tolerância ou de abstinência.

Uma das principais características da SDA, a distinção entre dependência e os problemas em consequência do uso de álcool, também inspirou os autores do DSM III- R⁷ a estabelecerem critérios para a identificação do uso nocivo de substâncias e a diferenciação com a dependência. A classificação da DSM III- R para uso nocivo e dependência alcoólica influenciou tanto o DSM IV⁸ quanto sistema de classificação desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde, CID- 10⁹. As classificações DSM III R, DSM IV e o CID 10 têm critérios similares para dependência alcoólica (tabela 1). O mesmo não acontece, entretanto, com o diagnóstico de uso nocivo. Um ponto comum entre estas classificações é a impossibilidade do diagnóstico de uso nocivo em um indivíduo que atualmente preenche critérios para dependência. Por outro lado, o DSM IV exclui o diagnóstico de uso nocivo num indivíduo que alguma vez foi dependente, enquanto a CID 10 não impede o diagnóstico posterior de uso nocivo em um indivíduo com diagnóstico de dependência no passado

(tabela 2). Embora Edwards tenha claramente demonstrado a distinção entre a dependência e o uso problemático do álcool, o que se confirmou em estudos posteriores, a classificação diagnóstica de uso nocivo, tal como é definida pelos critérios do CID 10 e DSM IV, ainda permanece com validade e confiabilidade baixas.

VI - Padrão de consumo

Na avaliação individual do paciente, além de se diagnosticar a dependência ou o uso nocivo, é necessário que se pesquise o seu *padrão de consumo* de bebida, para que se possa estabelecer o nível de gravidade de uso. Para essa medida utiliza-se o conceito de unidade de álcool, sendo que esta equivale de 10 a 12 g de álcool puro. Ao se multiplicar a quantidade de bebida por sua concentração alcoólica, obtém-se as unidades de álcool equivalentes. Embora seja uma questão controversa, os índices de consumo de 21 unidades ao longo da semana para o homem e de 14 unidades para as mulheres, são considerados de baixo risco de desenvolver problemas ². (tabela 3).

Além disso, sendo um transtorno com múltiplas repercussões na saúde do indivíduo, a SDA também se apresenta em diversos graus e formas. A CID-10 traz a classificação F10. *Transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de álcool*, com as seguintes subdivisões ⁹

F10.0 Intoxicação aguda

F10.1 Uso nocivo

F10.2 Síndrome de dependência

.3 Estado de abstinência

.4 Estado de abstinência com *delirium*

.5 Transtorno psicótico

.6 Síndrome amnésica

.7 transtorno psicótico residual e de início tardio

.8 outros transtornos mentais e de comportamento

.9 Transtorno mental e de comportamento não-especificado.

VII- Considerações finais

Nos últimos anos houve acúmulo crescente de evidências de confiabilidade e validade no diagnóstico de dependência do álcool, seja em estudos com amostras clínicas e populacionais, seja em estudos genéticos realizados em vários países do mundo.

Apesar de todos os avanços ocorridos, os critérios para dependência ainda podem ser aprimorados. Vários investigadores estão interessados em identificar subtipos de alcoolismo, que reagiriam de forma distinta a diferentes tratamentos. Além disso, os critérios para dependência e uso nocivo provavelmente diferem na população adolescente e este é um tópico importante para futuras pesquisas.

Quanto à classificação de uso nocivo de álcool, esta seguramente será um dos tópicos de discussão do grupo de trabalho da DSM V, que investigará seu papel e sua definição, com o objetivo de aumentar sua validade e confiabilidade diagnósticas ¹⁰.

VIII- Conclusão

A SDA é um transtorno psiquiátrico com severas repercussões individuais, sociais e econômicas de âmbito mundial.

O seu quadro clínico é bastante estudado e conhecido e embora, seus critérios diagnósticos sejam claros e tenham sido estabelecidos há vários anos, os transtornos relacionados ao uso de álcool ainda constituem um drama para a saúde pública, tanto pela dificuldade de seu tratamento, quanto pelo desafio que a identificação dos casos iniciais e às vezes, até dos quadros mais avançados representam para os médicos.

Neste artigo a SDA é apresentada em sua gênese e em seu desenvolvimento como conceito médico, até atingir a definição atual tanto na CID-10 quanto no DSM-IV. Os elementos que

compõem seu quadro clínico são destacados em cotejamento com o quadro de uso nocivo de álcool.

Esta distinção é importante para que na prática clínica sejam investigados os problemas relacionados aos distintos modos de uso do álcool, que se apresentam em diversos níveis de risco e de gravidade e que evoluem como um *continuum*.

Incentiva-se, assim, o diagnóstico e o tratamento precoces e a interrupção do curso de uma enfermidade que avança de modo lento e insidioso, mas devastador em todas as dimensões da vida.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Bachelard, G. A psicanálise do fogo. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
2. Laranjeira R, Nicastrí S. Abuso e dependência de álcool e drogas. In: Almeida O, Dractu L, Laranjeira R, Manual de psiquiatria. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1996. p.84-89.
3. Grant, G. F., Dawson, D. A. Alcohol and drug use, abuse, and dependence: classification, prevalence, and comorbidity. In: McCrady, B S., Epstein, E E, editors. Addictions – a comprehensive guidebook London: Oxford University Press, 1999. p.10.
4. American Psychiatric Association (APA). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Third Edition*. Washington, DC: APA, 1980
5. World Health Organization (WHO). *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems*. Eighth Revision. Geneva: WHO, 1968
6. Edwards, G., and Gross, M. Alcohol dependence: Provisional description of a clinical syndrome. *British Medical Journal* 1:1058–1061, 1976
7. American Psychiatric Association (APA). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Third Edition- Revised*. Washington, DC: APA, 1987
8. American Psychiatric Association (APA). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition*. Washington, DC: APA, 1994
9. World Health Organization (WHO). *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems*. Tenth Revision. Geneva: WHO, 1993
10. Hasin, D.; Schuckit, M.A.; Martin, C.S.; et al. DSM–IV alcohol dependence: What do we know, what do we need to know? *Alcoholism: Clinical and Experimental Research* 27:244–252, 2003

Analice de Paula Gigliotti
Rua Sorocaba 464 sala 209
Botafogo
Rio de Janeiro- RJ
Brasil
CEP- 22 271-110

e-mail- analice@iis.com.br

TELEFONES PARA CONTATO:

2537 9005 ramal 209

2539 6669

2266 0295/